

# TARLOVOVA CYSTA

## PERINEURÁLNÍ CYSTA

Tarlovova cysta (nebo také perineurální cysta) je vzácné onemocnění, které je dle Orpha.net charakterizované přítomností cyst nervových kořenů, které jsou naplněné mozkomíšním mokem. V MKN ji najdete pod kódem **G54.8 - jiné poruchy nervových kořenů a pletení**.


### Symptomy\*:

**\*Symptomy se odvíjejí od lokace cysty - tyto cysty se mohou nacházet kdekoliv v páteřním kanálu, nejčastěji se však nachází v sakrální (křížové) oblasti**

- Bolest ve spodní části zad, v hýždích, nohou a chodidlech
- Bolest na hrudi, horní části zad, krku, paží a rukou
- Slabost a/nebo křeče v nohou a chodidlech / rukou a dlaních
- Parestezie (abnormální cití) v nohou a chodidlech nebo rukou a dlaních
- Bolesti i při jen krátkodobém stání či sezení
- Bolesti při kýchání nebo kašlání
- Neschopnost vyprázdnit močový měchýř nebo v extrémních případech neschopnost močit a potřeba cévkování
- Změny ve funkci močového měchýře či střev, včetně inkontinence
- Otoky sakrální (nebo krční, hrudní či bederní) oblasti páteře
- Bolestivost, pocity tlaku a citlivosti v sakrální oblasti a kostrči, probíhající přes kyčel a do stehna
- Bolesti hlavy (kvůli změnám tlaku mozkomíšního moku), někdy doprovázené rozostřeným viděním, dvojitým viděním, tlakem za očima a útlakem optického nervu, způsobující papiledém (otok optického nervu)
- Pocity "sezení na kameni" a bolestivost kostrče
- Ischias
- Vaginální, rektální a pánevní bolesti a/nebo bolesti břicha
- Syndrom neklidných nohou
- Syndrom permanentního sexuálního vzrušení
- Sexuální dysfunkce a bolestivý pohlavní styk

### Více informací o Tarlovově cystě:

[vigdis-thompson-foundation.org](http://vigdis-thompson-foundation.org)  
[tarlovcystfoundation.org](http://tarlovcystfoundation.org)  
[tarlovovacysta.org](http://tarlovovacysta.org)



# FAKTA O TARLOVOVĚ CYSTĚ

- Diagnostikují se magnetickou rezonancí
- Ve většině případů se nachází v křížové oblasti, ale mohou být v jakémkoliv úseku páteře
- Mohou v průběhu času růst a způsobit erozi kosti & útlak a poškození nervů
- Mají tendenci vyskytovat se ve shlucích
- Mohou je mít ženy i muži, ale častěji se vyskytují u žen
- Tyto cysty mohou mít mnoho příčin vzniku jako jsou například úrazy a porody (použití epiduralu) a velmi často se objevují u pacientů s vrozenými poruchami pojivové tkáně (jako je například Ehlers-Danlosův či Marfanův syndrom), které se vyznačují křehkostí tkání a hypermobilitou
- Léčba spočívá v managementu symptomů či operaci

## Co dělat, pokud máte podezření na Tarlovovu cystu?

Žádanku na magnetickou rezonanci vám může předepsat například neurolog nebo ortoped. Pokud se diagnóza prokáže, nejlepší je nález konzultovat s neurochirurgem, který se Tarlovovými cystami opravdu zabývá. Doporučujeme si vždy vyžádat / zakoupit CD s výsledky rezonance - pro snazší komunikaci a konzultaci s dalšími lékaři (a kvůli možnosti podívat se na výsledky sám).

